

Korrekt melken in der Wallonie ; vom OSaM empfohlen

Fiche technique
2018-05



Source photos : Comité du Lait - Battice

Mitteilung des Observatoriums für die Eutergesundheit basierend auf die Forschungsprojekte "Ecopathologique, LAECEA, Mammipack, MammiScan" die zwischen 2005 und 2015 durchgeführt wurden. Das Observatorium möchte Ihnen helfen den Antibiotikaeinsatz, verursacht durch Euterprobleme, zu verringern !

Um den Gehalt an somatischen Zellen in der Milch zu senken, empfiehlt das OSaM die angewandten Methoden der besten Milchviehherden der Wallonie in Sachen Zellgehalt :

1. **Vor dem Melken** : Die **ERSTEN MILCHSTRAHLEN** abmelken um die Gefahr, dass infizierte Milch in den Tank gemolken wird, zu verringern. Ein weiterer Vorteil ist, dass dabei Oxytocin freigesetzt und das Melken so erleichtert wird.



2. **Nach jedem Melken** :

- Die **ZITZENGUMMIS** korrekt reinigen. Durch verschmutzte Gummis können Umweltkeime während des Melkens übertragen werden ;
- Die **EUTERTÜCHER** in der Waschmaschine bei 60°C mit einem angepassten Reinigungs- und Desinfektionsprodukt waschen oder Euterpapier benutzen ;
- Kein **NACHMELKEN**: wobei das Melkgerät zum Melkende hin per Hand runtergedrückt wird ;
- **DIPPEN** nach dem Melken: die Zitze komplett in eine anerkannte Lösung eintauchen. Dabei benutzt man einen Becher ohne Rückfluss. (Beim Sprühen wird Produkt verschwendet) ;
- Kühe mit Zellproblemen und behandelte Kühe mit einem Fesselband **KENNZEICHNEN**.

3. Eine saubere **ABKALBEBOX** während des ganzen Jahres bereitstellen.

4. Der Zellgehalt der Herdenmilch sollte unter **250.000 ZELLEN/ml** liegen.

5. Weniger als 25% der Kühe sollten Zellgehalte über 400.000 Zellen/ml aufweisen.



Bei klinischen Euterentzündungen, hat das OSaM die besten Resultate in den Betrieben festgestellt wo folgende Praktiken angewandt wurden :

1. **VORDIPPEN** :mit einer anerkannten Lösung die Zitze vor dem Melken dippen und nach min 30 Sek mit einem saugenden Papier abtrocknen.
2. **SCHNELL und STRESSFREI** melken : Stimulation von 60-90 Sek. vor dem Ansetzen des Melkgeräts.
3. Die Euter **SCHEREN**.
4. Die Tiere in einem Boxenlaufstall mit **ABKALBEBOX** beherbergen. Reihenfolge beim Melken.
5. Die Zitzengummis rigorös und mit Bedacht desinfizieren (Desinfektion nach dem Reinigen).

